

Частота встречаемости компонентов коморбидного фона модифицированного индекса коморбидности Чарльсон [24]
в соответствии с принципами сопоставления кодов МКБ-10 по Beyrer J. и соавт. [25]

Comorbid background components of the modified Charlson comorbidity index [24]
in accordance with the principles of ICD-10 code matching according to Beyrer J. et al. [25]

	Баллы	Количество пациентов (%)
Инфаркт миокарда (острый или в анамнезе)	1	33 (3,4%)
Сердечная недостаточность	1	287 (29,8%)
Заболевания периферических сосудов	1	126 (13,1%)
Цереброваскулярные заболевания	1	56 (5,8%)
Деменция	1	5 (0,5%)
Хронические болезни легких	1	92 (9,6%)
Ревматические заболевания	1	9 (0,9%)
Язвенная болезнь	1	13 (1,4%)
Заболевания печени умеренные	1	57 (5,9%)
Диабет без хронических осложнений	1	32 (3,3%)
ХБП 1-4	2	0 (0%)
Диабет с хроническими осложнениями	2	154 (16%)
Гемиплегия или пареплегия	2	3 (0,3%)
Злокачественные заболевания, включая лимфому и лейкемию	2	14 (1,5%)
Заболевания печени тяжелые	3	7 (0,7%)
ХБП 5	3	962 (100%)
Инфицирование вирусом иммунодефицита человека без синдрома приобретенного иммунодефицита	3	2 (0,2%)
Солидное злокачественное новообразование с метастазами	6	3 (0,3%)
Синдром приобретенного иммунодефицита	6	0 (0%)
50-59 лет	1	366 (38%)
60-69 лет	2	186 (19,3%)
70-79 лет	3	31 (3,2%)
≥80 лет	4	8 (0,8%)